

Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

V11

ROWATINEX
kapky, tobolky

V: Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co. Cork, Irsko.

S: Kapky: Pinenum (alfa + beta) 31 g, Camphenum 15 g, Cineolum 3 g, Phenchonum 4 g, Borneolum 10 g, Anetholum 4 g ve 100 g roztoku. Tobolky: Pinenum (alfa + beta) 31 mg, Camphenum 15 mg, Cineolum 3 mg, Phenchonum 4 mg, Borneolum 10 mg, Anetholum 4 mg v 1 tobolce.

PL: Kapky: olivový olej. Tobolky: olivový olej, sodná sůl ethylparabenu, sodná sůl propylparabenu.

DI: 1 ml roztoku odpovídá 26 kapkám.

IS: Fytofarmakum - urologikum, diuretikum, antiseptikum.

CH: Rowatinex je směs terpenů, která zvyšuje vylučování moče, zmírňuje křeče močových cest a umožňuje rozpad, rozpouštění a vyplavování ledvinových a močových kamenů. Je účinná při akutních i chronických zánětech močových cest a překrvením ledvin přispívá ke zvýšenému vylučování moči.

I: Rowatinex se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění močových cest, při zánětech a infekcích močových cest, ke zmírnění zejména kolikovitých křečí. Je vhodný při ledvinových a močových kamenech a napomáhá k jejich rozpadu, rozpouštění a vyplavování.

KI: Nejsou známy.

NÚ: Rowatinex je zpravidla velmi dobře snášen. U osob přecitlivělých na některou jeho složku se mohou objevit mírné alergické kožní reakce (zejména u kapek). Ve zcela ojedinělých případech byly popsány žaludeční obtíže a nevolnost. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

IT: Rowatinex může ovlivňovat účinek léků používaných ke srážlivosti krve a léků, které jsou používány k zlepšení činnosti jater a vylučování žluči nebo jsou metabolizovány v játrech nebo v ledvinách.

TL: Přípravky by neměly být podávány ženám v prvních 3 měsících těhotenství a po dobu kojení.

D: Kapky

Nedoporučí-li lékař jinak

Dospělí: 4-5krát denně 3-5 kapek na kostku cukru nebo kousek sucharu před jídlem.

Děti od 6 do 14 let: 3-4krát denně 1-2 kapky na kostku cukru, kousek sucharu nebo piškotu před jídlem.

Tobolky

Nedoporučí-li lékař jinak

Dospělí: 3-4krát denně 1 tobolku před jídlem.

Děti od 6 do 14 let: 1-2krát denně 1 tobolku před jídlem.

UZ: Přípravky Rowatinex jsou určeny pouze k vnitřnímu užití. K přesnému odměření dávky roztoku použijte vždy kapátko.

U: Při teplotě do 25 st. C. U kapek po každém použití lahvičku dobře uzavřete.

VA: Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

BA: 20, 50 a 100 tobolek, 10 ml kapek.

DZ: 18.1.2000 (č.j. 39612/99)

2000/01/18