

Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

C05CX

AESCIN-TEVA
(Escinum alfa)
potahované tablety

V: Teva Kutno S.A., Kutno, Polsko.

DR: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR.

S: Alfa-aescinum 20 mg v 1 potahované tabletě.

PL: Monohydrát laktózy, bramborový škrob, povidon, mastek, stearan hořečnatý, polysorbát 80, disperse methakrylátového kopolymery typu L 30%, sodná sůl karmelózy, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak oranžové žlutí (E110).

IS: Antiflogistikum, venofarmakum.

CH: Alfa-aescin působí proti otokům a zánětům. Normalizuje propustnost stěn vlásečnic, omezuje vznik pooperačních otoků, urychluje vstřebávání poúrazových podlitin a zmenšuje pravděpodobnost jejich vzniku po operacích a usnadňuje vyprazdňování křečových žil u pacientů s poruchami žil dolních končetin.

I: Přípravek se užívá k léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě žilních onemocnění dolních končetin a zánětů šlachových pochev. Také se užívá k léčení bolestivých syndromů páteře s projevy útisku míšních nervových kořenů (poruchy "plotének", ústřel, ischias, bolestivé napětí v šíji).

Přípravek mohou užívat děti od 3 let věku i dospělí.

KI: Přípravek nesmí být užíván při precitlivělosti na některou z jeho složek, při těžších poruchách funkce ledvin, nemocnými s otoky, které vznikly v důsledku onemocnění srdce, ledvin nebo jater a dále v prvních třech měsících těhotenství. Od čtvrtého měsíce těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen ze zvlášť závažných důvodů a na výslovné doporučení lékaře.

NÚ: Ojedinelé se mohou vyskytovat nevolnost a zvracení, návaly horka, zrychlení srdeční frekvence a mírné svědění pokožky, případně alergické kožní reakce (vyrážky, svědění), snížení krevního tlaku. Tyto nežádoucí účinky bývají přechodné a obvykle samy vymizí. Přesto se při jejich případném výskytu nebo při výskytu jiných neobvyklých reakcí poraďte o dalším užívání přípravku s lékařem.

IT: Účinky přípravku Aescin-Teva účinky jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Aescin-Teva. Než začnete současně s užíváním přípravku Aescin-Teva užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Aescin-Teva může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve.

Aescin-Teva může rovněž zesílit toxické působení některých léků (např. aminoglykosidových antibiotik) na ledviny.

D: Neurčí-li lékař jinak, obvykle užívají dospělí: zpočátku 3krát denně 2 potahované tablety, při udržovací léčbě většinou postačí užívat 1 potahovaná tableta 3krát denně. Dětem od 3 let se podává 2-3krát denně 1 potahovaná tableta.

ZP: Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody.

UZ: Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

U: Uchovávejte při teplotě 15-25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VA: Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BA: 30 potahovaných tablet v blistru v papírové krabičce.

DZ: 13.6.2007 (č.j. 15752/07)

2007/06/13/V